

**FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA**

Id especie:

**Nombre Científico***Cinclodes oustaleti baeckstroemii*  
Lönnerberg, 1921**Nombre Vernacular**Churrete chico de Masafuera, churreta,  
churrete de Juan Fernández**Familia: Furnariidae****Sinonimia**

No tiene sinónimos

**Antecedentes Generales**

Especie pequeña (16 – 18 cm. y 22 – 31 g.), pardo negruzca arriba, con notable ceja blanca. Gris abajo, con garganta blanca, pecho manchado con líneas blancas (van Remsen 2003, Martínez y González 2004). Similar a la especie del continente, fue reconocida como subespecie por Hellmayr dado el consistente color rojizo-castaño brillante en los costados y en las subcaudales distinto al grisáceo de las subespecies del continente (Johnson 1967), hecho también notado por Brooke (1987a). Nidifica entre mediados de Noviembre hasta Febrero (Hahn et al. 2005b).

**Distribución geográfica (extensión de la presencia)**

Endémico de la Isla Alejandro Selkirk (Masafuera). No está presente en las otras islas del Archipiélago, contrario a lo mencionado por Johnson (1967) según lo observado por Millie en 1955. Aparentemente Millie confundió el nombre de las islas, hecho también notado por Brooke (1987a) y Hahn y Römer (1996). De hecho, Brooke (1987a) no lo encontró en la Isla Robinson Crusoe ni en Santa Clara durante 1985/86.

La extensión de presencia llega a 50 km<sup>2</sup>.**Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional**

Hahn et al. (2005) estimaron el tamaño poblacional en unos 1.500 individuos con datos tomados entre noviembre del 2001 y febrero del 2002.

**Tendencias poblacionales actuales**

Hahn et al. (2006) estiman que la población se mantuvo estable en cerca de 1.500 individuos entre 1994/95 y 2001/02.

**Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)**

Esta especie se puede encontrar en todo el rango altitudinal en la isla (Bourne 1983, Brooke 1987a, Hahn et al. 2005b), sin embargo es más abundante cerca de los cursos de agua (Brooke 1987a, Hahn et al. 2005b). Usualmente se puede encontrar en quebradas como El Tongo, Varadero, Inocentes, Vacas, Casas, Sánchez y Guatón (Hahn et al. 2005b). No ocupa las playas rocosas, excepto cuando existen pequeñas cascadas de agua dulce que llegan al mar (Brooke 1987a, Hahn et al. 2005b). También está presente en sectores altos donde no hay cursos de agua permanente, como en áreas abiertas con helechos de altura (*Lophosoria quadripinnata*), en crestas y paredes rocosas (Hahn et al. 2005b).

Hahn et al. (2005b) estiman que esta subespecie ocupa aproximadamente unas 22 km<sup>2</sup>.**Principales amenazas actuales y potenciales**

Los incendios y el sobrepastoreo por cabras (*Capra hircus*) han producido destrucción y degradación de las condiciones del hábitat usado por esta especie, haciéndolo en general más seco (Hahn et al. 2005b). Además, los adultos y sus nidos pueden ser depredados por roedores exóticos introducidos en la isla (Hahn et al. 2005b, 2006). No se acepta disminución de la calidad del hábitat, cuando la resultante de las principales perturbaciones tiende a generar lugares que pueden ser usados por esta especie.

**Estado de conservación**

Esta subespecie está catalogada como En Peligro (Glade 1993)

A nivel de especie, *Cinclodes oustaleti* está catalogada como LC, esto es de Preocupación Menor por UICN (BirdLife International 2004d).

### Propuesta de Clasificación

Este Comité, en reunión del 09 de abril de 2008 concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), es:

**VULNERABLE VU D2**

Dado que:

D2 -Población restringida en su número de localidades, menos de cinco (presente en una sola localidad, Isla Marinero Alejandro Selkirk)

De acuerdo a las categorías y criterios de la UICN, versión 3.1, la clasificación corresponde a la misma que la señalada anteriormente, esto es: **VULNERABLE VU D2**

### Experto y contacto

Jorge A. Tomasevic

Lab. Ecología de Vida Silvestre  
Dpto. Manejo de Recursos Forestales  
Universidad de Chile  
Casilla 9206, Santiago  
+ 56 2 978 58 77  
jatomasevic@yahoo.com

### Bibliografía citada revisada

- BROOKE, M DE L. 1987a. The birds of Juan Fernandez Islands, Chile. International Council for Bird Protection (ICBP) Tech. Report 16. Cambridge, UK.
- GLADE, AA (Ed.). 1993. Libro Rojo de los vertebrados terrestres de Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.
- HAHN, I, AND U RÖMER. 1996. New observations of the Masafuera Rayadito *Aphrastura masafuerae*. Cotinga 6: 17 – 19.
- HAHN, I, U RÖMER, AND R SCHLATTER. 2005. Distribution, habitat use, and abundance patterns of landbird communities on the Juan Fernández islands, Chile. Ornitología Neotropical 16: 371 – 385.
- HAHN, I, U ROMER, AND RP SCHLATTER. 2005b. First description of nesting ecology of the endemic Grey-Flanked Cinclodes *Cinclodes oustaleti baeckstroemii* from the Juan Fernandez Islands, Chile. Acta Ornithologica 40 (2): 165 - 169.
- HAHN, I, U RÖMER, AND R SCHLATTER. 2006. Population numbers and status of land birds of the Juan Fernandez Archipelago, Chile. Senckenbergiana Biologica 86: 109 – 125.
- JARAMILLO, A. 2003. The birds of Chile. Princeton Field Guides, Princeton University Press, Princeton, USA.
- JOHNSON, AW. 1967. The birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru. Volume II. Platt Establecimientos Gráficos S.A., Buenos Aires, Argentina.
- MARÍN, M. 2004. Lista comentada de las aves de Chile. Lynx Edicions, Barcelona, España.
- MARTÍNEZ, D Y G GONZÁLEZ. 2004. Las aves de Chile, nueva guía de campo. Ediciones del Naturalista, Santiago, Chile.
- SAG. 2000. Cartilla de la Ley de Caza y su reglamento. DEPROREN, SAG, Santiago, Chile.
- VAN REMSEN, J. 2003. Family Furnariidae (ovenbirds). Pp: 162 – 357 in del Hoyo, J, A Elliot, and DA Christie. Handbook of the Birds of the World. Volume 8: Broadbills to Tapaculos. Lynx Edicions, Barcelona, Spain.

### Bibliografía citada NO revisada

### Sitios Web citados

BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2004d. *Cinclodes oustaleti*. In: IUCN 2006. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. <[www.iucnredlist.org](http://www.iucnredlist.org)>. Downloaded on **06 January 2007**.

### Autores de esta ficha

Jorge A. Tomasevic, Lab. Ecología de Vida Silvestre, Dpto. Manejo de Recursos Forestales, Universidad de Chile, Casilla 9206, Santiago. Teléfono:+ 56 2 978 58 77, e-mail: [jatomasevic@yahoo.com](mailto:jatomasevic@yahoo.com)  
Corregido por: Secretaría Técnica Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres, e-mail: [clasificacionespecies@conama.cl](mailto:clasificacionespecies@conama.cl)

Figura 1a. Adulto.



© Andrea K. Suardo

Figura 1b. Juvenil recientemente salido del nido



© Jorge A. Tomasevic

Figura 2. Extensión de presencia de *Cinclodes oustaleti baeckstroemii*.

