

CANQUÉN COLORADO

(*Chloephaga rubidiceps*)

Antecedentes generales

Habitat:

Durante el periodo reproductivo en Chile, el Canquén colorado habita en la estepa magallánica (Continente y Tierra del Fuego), utilizando principalmente las vegas de ese ambiente.

Distribución:

Se distribuye en dos poblaciones que aparentemente no se relacionan: una sedentaria restringida a las Islas Malvinas y una migratoria que nidifica en el extremo sur de Chile y Argentina y migra durante el invierno hacia la provincia de Buenos Aires.

El área de cría en Chile continental se extiende desde la desembocadura del Río San Juan hasta el límite con Argentina en Punta Dungeness. En Tierra del Fuego se concentra en el sector norte de la isla.

Amenazas:

Las razones de su declinación aun no están determinadas, pero en la actualidad esta disminución se atribuye a la introducción del zorro gris en la isla de Tierra del Fuego en los años 50' y a la escasez de hábitat que otorgue sitios seguros para nidificar. Además, tanto en Chile como en Argentina la especie es sometida a presión de caza.

Población:

Fue abundante en Tierra del Fuego hasta 1950, en que se estimaba su población en miles de individuos y constituía más del 50% del total de gansos silvestres. Desde entonces presenta un fuerte declive, censos exhaustivos realizados en Chile en el 2001 determinaron, una población de 900 individuos registrándose 32 parejas reproductivas distribuidas en el área de San Gregorio, Desembocadura del Río San Juan y el sector norte de Tierra del Fuego.

Otros:

Catalogada En peligro por Rottmann & López-Callejas (1992). Está prohibida su caza, captura, tenencia o transporte por la Ley de Caza N° 19.473. Considerado En Peligro en el Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile. UICN lo considera como Preocupación Menor (LC).

Resultado de la Clasificación:

La especie *Chloephaga rubidiceps* fue clasificada según disposiciones establecidas en el RCE, en la siguiente Categoría y criterios de la UICN:

Categoría: **En Peligro**

Criterio: EN B2ab(iii)

Razones del Comité de Clasificación:

Ambas poblaciones de la especie han presentado clara disminución, aunque las razones aún no están determinadas, se atribuyen a la introducción del zorro gris en la Isla de Tierra del Fuego y a la escasez de hábitat seguros para nidificar. Al mismo tiempo, la especie es sometida a presión de caza.

Bibliografía

* Araya, B & M. Bernal. 1995. Aves. En: Simonetti, J. A., M. T. K. Arroyo, A. Spotorno & E. Lozada (Eds.). 1995. Diversidad Biológica de Chile. Comité Nacional de Diversidad Biológica, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Santiago, Chile.

* Blanco, D. E. Mejorando la situación de conservación del Cauquén Colorado (*Chloephaga rubidiceps*) en Argentina y Chile. Wetlands International. 4 pp.

* Blanco, D.E., R. Matus, O. Blank, L. Venegas, S. Goldfeder, F. Moschione & s. Zalba. 2001. Manual para la conservación del cauquén (Canquén) colorado en Argentina y Chile. Wetlands International. Buenos Aires, Argentina.

* Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres. 3er Taller Regional para América Latina. 2001. Lima, Perú. 7 pp.

* De la Balze V. & D. Blanco. El cauquén colorado (*Chloephaga rubidiceps*): una especie amenazada por la caza de "avutardas". Primer Taller sobre la Caza de aves Acuáticas Wetlands International. Buenos Aires, Argentina. 119- 122.

* Del Hoyo, J., Elliot, A. & J. Sargatal (Eds.). 1992. Handbook of the Birds of the World. Vol. 1. Lynx Edicions. Barcelona. España.

* Fjeldsa, J. & N. Krabbe (Eds.). 1990. Birds of High Andes. Zoological Museum, University of Copenhagen. Copenhagen, Denmark. 876 pp.

* Glade, A. (Ed.) 1993. Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 65 pp.

* Matus, R., O. Blank, D. Blanco, J. Madsen, L. Venegas & G. Mateazzi. 2000. El Canquén Colorado (*Chloephaga rubidiceps*): antecedentes sobre sitios de reproducción y concentración en la XII Región de Magallanes, Chile. Boletín Chileno de Ornitología 7: 13-18.

* Matus, R., Y. Vilina & J. Gibbons. 1997. Estado de las poblaciones de canquén de cabeza colorada (*Chloephaga rubidiceps*) en Magallanes, Chile. III Congreso Chileno de Ornitología. Santiago, Chile. 12 pp.

* Rottmann, J. & López-Callejas, M.V. 1992. Estrategia Nacional de Conservación de Aves. UNORCH. Serie Técnica, año 1, N° 1. 16 pp.

* Vuilleumier, F. 1994. Status of the ruddy-headed goose *Chloephaga rubidiceps* (Aves, Anatidae): a species in serious danger of extinction in Fuego-Patagonia. *Revista Chilena de Historia Natural* 67: 341-349.

* Vuilleumier, F. 1998. Avian biodiversity in forest and steppe communities of chilean Fuego-Patagonia. *Anales del Instituto de la Patagonia* 26: 41-57.

* The Falkland Islands.
<http://www.jncc.gov.uk/international/pdf/FI.pdf>

* *Chloephaga rubidiceps*.
http://www.biologie.uni-freiburg.de/data/zoology/riede/groms/Species_HTMLs/Crubidic.html