

## **SÁNDALO DE JUAN FERNÁNDEZ**

(*Santalum fernandezianum*)

### **Antecedentes generales**

Hábitat:

Habitó en el Archipiélago de Juan Fernández posiblemente tanto en sitios de fácil acceso como en laderas escarpadas.

Distribución:

Este sándalo se encontraba solamente en el archipiélago de Juan Fernández, ubicado en el Océano Pacífico sur, a 360 millas náuticas de la costa de Chile central.

Amenazas:

Su explotación comenzó en el siglo XVII donde en varios manuscritos de la época se menciona la gran cantidad de árboles que existía en el Archipiélago. Durante el siglo XVIII comenzó a ser una especie escasa, sin que por ello se disminuyera su intensa explotación. Actualmente la flora de Juan Fernández está amenazada por erosión, incendios, tala indiscriminada y en forma significativa por especies exóticas introducidas, como por ejemplo, ganado caprino y bovino, conejo europeo y flora vascular.

Población:

El último ejemplar registrado de *Santalum fernandezianum* fue en 1908, en Puerto Inglés, Isla Robinson Crusoe, presumiendo su extinción entre 1910 y 1916.

### **Resultado de la Clasificación:**

La especie *Santalum fernandezianum* fue clasificada según disposiciones establecidas en el RCE, en la Categoría: **Extinto**

### **Razones del Comité de Clasificación:**

A pesar de que el último ejemplar del cual se tiene registro fue visto en 1908, presumiendo su extinción entre 1910 y 1916, entre 1988 y 2003 se realizaron prospecciones en su búsqueda sin que se lograra encontrar ningún individuo.

### **Bibliografía**

- RICCI, M. (2005). Conservation status and ex situ Cultivation Efforts of Endemic flora of the Juan Fernández Archipelago. Biodiversity and Conservation, Jul 2005, -46.
- RODRÍGUEZ R., O. MATTEHI & M. QUEZADA. 1983. Flora Arbórea de Chile. Editorial Universidad de Concepción.