

TRICAHUE

(*Cyanoliseus patagonus bloxami*)

Antecedentes generales

Habitat:

El tricahue habita ambientes semiáridos precordilleranos de la zona central de Chile, cercanos a ríos donde excava sus nidos en paredones.

Distribución:

Originalmente, la subespecie *C.p. bloxami*, endémica de Chile, fue muy abundante desde Atacama a Valdivia. en 1950 ya se describía como reducida a unas cuantas colonias aisladas (Goodall et al 1951). Actualmente se ha restringido considerablemente, desapareciendo de amplias zonas donde se encuentran numerosas colonias de nidificación abandonadas. El área actual más poblada se encuentra entre la VI y la VII región, donde se concentra el 85% de la población, el resto se encuentra en pequeños núcleos en la IV región.

Amenazas:

Las causas principales de su disminución habrían sido la cacería y extracción de crías, así como la modificación del hábitat. Su caza y captura es prohibida desde el año 1972 sin embargo habrían indicios de que aún continua activa en la IV Región. Desde 1984 que CONAF desarrolla un proyecto de conservación enfocado principalmente a la protección de las loreras en época reproductiva.

Población:

En censos realizados por CONAF en la VII Región, entre 1987 y 2001, se promediaron 1555 individuos. Restarían no más de 12 loreras activas en la zona central.

Otros:

Está prohibida su caza, captura, tenencia o transporte desde 1972, DS N° 40. Considerado En Peligro en el Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile y por la Estrategia Nacional de Conservación de Aves. IUCN no lo ha clasificado.



Resultados de la Clasificación:

Para la especie *Cyanoliseus patagonus bloxami*, se aplicó un procedimiento de clasificación a nivel regional. Se clasificó según disposiciones establecidas en el RCE, en las siguientes Categorías y Criterios de la UICN:

Para la III y IV Regiones:

Categoría: **En Peligro**

Criterios: EN A2acd

Para el resto de su distribución en nuestro país,

Categoría: **Vulnerable**

Criterios: VU A1acd

Razones del Comité de Clasificación:

La especie se distribuía desde Copiapó hasta Valdivia, disminuyó drásticamente su número debido a la cacería y captura de sus crías para mascota, extinguiéndose en al menos 4 regiones del país de acuerdo a su distribución original (III, V, VIII regiones y región Metropolitana).

Actualmente se distribuye en la IV, VI y VII Región. Se considera que sus poblaciones se encuentran estables, sin embargo, la destrucción del hábitat y el tráfico de sus crías continúan operando de forma intensa en Chile, en especial en la IV Región.

No se cuenta con estimaciones poblacionales rigurosas en la VI y VII regiones que den cuenta de una supuesta situación de estabilidad o aumento poblacional.

Bibliografía

- Fjeldsa, J. & N. Krabbe (Eds.). 1990. Birds of High Andes. Zoological Museum, University of Copenhagen. Copenhagen, Denmark. 876 pp.
- Muñoz, M., H. Núñez & J. Yáñez (Eds.). 1996. Libro Rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.
- Muñoz, M., H. Núñez & J. Yáñez (Eds.). 1996. Libro Rojo de los sitios prioritarios para la conservación de la diversidad biológica en

Chile. Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile.

- Glade, A. (Ed.) 1993. Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 65 pp.
- Del Hoyo, J., Elliot, A. & J. Sargatal. 1997. Handbook of the Birds of the World. Vol. 4. Sandgrouse to Cuckoos. Lynx Edicions. Barcelona. España.
- Manríquez, P. 1984. Censo y algunos antecedentes del loro trichahue *Cyanoliseus patagonus* en la precordillera andina de la sexta región. Boletín técnico n° 11, Corporación Nacional Forestal.
- Cruz, G. & C. Muñoz. 1986. Nuevos antecedentes del loro trichahue *Cyanoliseus patagonus* en la sexta región. Boletín técnico n° 30.
- Cruz, G. & C. Muñoz. 1986. Nuevos antecedentes del loro trichahue *Cyanoliseus patagonus* en la sexta región. Boletín técnico n° 30.
- Araya, B & M. Bernal. 1995. Aves. En: Simonetti, J. A., M. T. K. Arroyo, A. Spotorno & E. Lozada (Eds.). 1995. Diversidad Biológica de Chile. Comité Nacional de Diversidad Biológica, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Santiago, Chile
- Mann, G. 1978. Los Pequeños Mamíferos de Chile. Gayana Zoología, No. 40:1-342.
- Villa, A. 1998. Conservación del loro trichahue (*Cyanoliseus patagonus byroni*) en la Región del Maule, Chile. En La conservación de la fauna nativa de Chile, logros y perspectivas. Valverde, V. (Ed.). pp.19-25. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal.
- Goodall JD, AW Johnson & RA Phillipi (1951) Las aves de Chile, su conocimiento y sus costumbres. Volumen II. Platt Establecimientos Gráficos, Buenos Aires.