

FICHA DE ESPECIE CLASIFICADA

Nombre Científico	Nombre Común
<i>Hylorina sylvatica</i> Bell, 1843	Sapo esmeralda de la selva; rana dorada
Familia: Cycloramphidae	

Sinonimia

Hylorina sylvatica Bell, 1843, Zool. Voyage Beagle, Part 5: 44. Holotype: BM, de acuerdo a Boulenger, 1882, Cat. Batr. Sal. Coll. Brit. Mus., Ed. 2: 251. Localidad típica: "Archipelago of Chonos (S. of Chiloe) in thick forests", Chile Dado como "Chiloe" por Boulenger, 1882, Cat. Batr. Sal. Coll. Brit. Mus., Ed. 2: 251.

Cystignathus aeneus Guichenot, 1848, In Gay (ed.), Hist. Fis. Polit. Chile, Zool.: 102. Holotipo: depósito no documentado. Localidad tipo: "cercañas de Valdivia", Chile. Sinonimia por Cope, 1865, Nat. Hist. Rev., N.S., 5: 113; Jiménez de la Espada, 1875, Vert. Viaje Pacif. Verif. 1862-1865: 10; Boulenger, 1882, Cat. Batr. Sal. Coll. Brit. Mus., Ed. 2: 251.

Hylorhinus sylvatica — Günther, 1859 "1858", Cat. Batr. Sal. Coll. Brit. Mus.: 23. Enmienda injustificada del nombre genérico y específico.

Hylorhina aenea — Cope, 1866, J. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, Ser. 2, 6: 112.

Hylorhina sylvatica — Jiménez de la Espada, 1875, Vert. Viaje Pacif. Verif. 1862-1865: 10. Mal deletreado.

Hylorina andina Philippi, 1902, Supl. Batr. Chil. Descr. Hist. Fis. Polit. Chile: 74. Sintipos: MNHN (2 especímenes), ahora perdidos. Localidad tipo: "en los Andes de la provincia de Valdivia", Chile. Considerado un *nomen dubium* por Nieden, 1923, Das Tierreich, 46: 516. Sinonimia por Vellard, 1947, Acta Zool. Lilloana, 4: 151; Cei, 1958, Invest. Zool. Chilen., 4: 275; Gorham, 1966, Das Tierreich, 85: 124; Lavilla, 1994 "1992", Acta Zool. Lilloana, 42: 84.

Hylorina andina — Philippi, 1902, Supl. Batr. Chil. Descr. Hist. Fis. Polit. Chile: 159. Incorrect spelling of generic name.

Hylorina sylvatica — Philippi, 1902, Supl. Batr. Chil. Descr. Hist. Fis. Polit. Chile: 159. Deletreo incorrecto del nombre genérico y específico.

Hylorina longipes Philippi, 1902, Supl. Batr. Chil. Descr. Hist. Fis. Polit. Chile: 77. Holotipo: MNHN (ahora perdido). Localidad tipo: "provincia Valdivia", Chile. Considerado un *nomen dubium* por Nieden, 1923, Das Tierreich, 46: 516. Sinonimia por Vellard, 1947, Acta Zool. Lilloana, 4: 145-154; Cei, 1958, Invest. Zool. Chilen., 4: 275; Gorham, 1966, Das Tierreich, 85: 124; Lavilla, 1994 "1992", Acta Zool. Lilloana, 42: 84.

Hylorina longipes — Philippi, 1902, Supl. Batr. Chil. Descr. Hist. Fis. Polit. Chile: 159. Deletreo incorrecto del nombre genérico y específico.

Antecedentes Generales

Nativo

"*Gran hylido* [sic] *neotrópica arborícola, especialmente por la forma general de las extremidades y el pulgar oponible. Sin glándulas parótidas, pero con pliegue glandular pre-timpánico. Tiene cabeza grande, tan larga como ancha, ojos espaciados y hocico relativamente sobresaliente. Colores muy brillantes en*

ambos sexos que desaparecen rápidamente con la muerte del animal.” (Ceí 1962: 86).

Distribución geográfica (extensión de la presencia)

Desde el golfo de Arauco (Ramadillas) hasta la isla grande de Chiloé, ha sido documentada en los Chonos, y, por el margen pacífico de archipiélago de Chiloé hasta la isla Wellington. También en Argentina. Se estima la extensión de la presencia en 98.261 km².

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional

Sin antecedentes, aunque Veloso y Núñez (2003) señalan que las poblaciones son pequeñas.

Tendencias poblacionales actuales

Sin antecedentes.

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)

Bosques de *Nothofagus*, templados a fríos; aguadas temporales o permanentes con vegetación palustre; bordes de lagos y pantanos con abundante vegetación (Veloso & Núñez 2003). No estimada el área de ocupación.

Principales amenazas actuales y potenciales

Destrucción de hábitats y degradación, plantaciones exóticas y agricultura, especies de peces con fines comerciales en los hábitats de las larvas (Veloso & Núñez 2003).

Estado de conservación histórico

CONAF (1993), Formas (1995) y Núñez et al. (1997) señalan que está Insuficientemente Conocida. UICN (2001) señala que está en Preocupación Menor y Díaz-Páez & Ortiz (2003) señalan que está Fuera de Peligro. Según Veloso et al. (2003) su clasificación es Preocupación Menor. Clasificada según el DS 50 MINSEGPRES 2008 como Insuficientemente Conocida.

Acciones de protección

Protegido en PN de la X Región, no citado en CITES

Propuesta de Clasificación según RCE

En el marco del Séptimo Proceso de Clasificación de Especies, el Comité de Clasificación concluye incluir a la especie en la categoría:

PREOCUPACIÓN MENOR (LC)

Dado que:

NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en

alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable). Y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios.

Experto y contacto

Bibliografía citada revisada

Bibliografía citada NO revisada

Sitios Web citados

<http://www.globalamphibians.org/>

<http://www.redlist.org/>


Documento de Trabajo Preparado por: Herman Núñez y Carlos Garín
Revisado por Secretaría Técnica Comité de Clasificación de Especies (2010)

Imágenes



Tomado de

<http://www.photographersdirect.com/andresmorya/stockphoto.asp?imageid=224785&sourceid=11794>



Distribución de *Hylorina sylvatica*