

FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE		Id especie:	491
Nombre Científico:	<i>Malesherbia auristipulata</i> Ricardi		
Nombre Común:	Ají de zorra, piojillo		
Reino:	Plantae	Orden:	Malpighiales
Phyllum/División:	Magnoliophyta	Familia:	Malesherbiaceae
Clase:	Magnoliopsida	Género:	Malesherbia
Sinonimia:	<i>Malesherbia turbinea</i> auct. non J.F. Macbr.		
Antecedentes Generales:			
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:			
<p>Sufrútice erecto de 40-80 cm de alto, leñoso, ramificado desde la base, hirsuto, glanduloso; pelos unicelulares finos de 0,5-1,2 mm de largo; pelos glandulosos rojizos de 0,8-1,2 mm de largo. Ramas muy hojosas, leñosas, de color pardo verdoso, de 4-7 mm de diámetro, cicraticosas o con restos de hojas muertas en la base, terminadas en racimos de flores. Hojas alternas, sésiles, vellosas, especialmente en las nervaduras, lanceoladas u oblongo-lanceoladas, las inferiores de 35-45 mm de largo, por 8-12 mm de ancho, las superiores de 17-25 mm de largo por 3-6 mm de ancho, disminuyendo de tamaño hacia la inflorescencia; margen lobulado, cada lóbulo con 3-7 dientes terminados en un grueso pelo glanduloso a modo de cilio; nervadura hundida en el haz, sobresaliente en el envés. Estípulas auriculiformes, subdentadas, ciliadas de pelos glandulosos, en las hojas inferiores de 5-8,5 mm de largo mientras que en las superiores de alrededor de 2 mm de largo. Inflorescencia en racimo simple terminal, de 15-35 cm de largo en las ramas principales y de 4-8 cm de largo en las secundarias. Flores numerosas, persistentes, axilares, caedizas cuando maduran los frutos; pedicelos de 7-7,3 mm de largo; brácteas 2, subopuestas, insertas más o menos en la mitad del pedúnculo, oblongo-lanceoladas, de 3-4 mm de largo, por 2-2,5 mm de ancho, vellosas, denticuladas y ciliadas de pelos glandulosos, con dos pequeños muñones estipuliformes en la base. Receptáculo obcónico, de 12-15 mm de alto, por 7-8 mm de ancho apical, membranoso, de color rojo pálido, hirsuto por fuera, glabro por dentro; venas de color castaño oscuro. Sépalos casi lineares, de 7-9 mm de largo por 2,1-2,3 mm de ancho, de color rojo pálido, densamente vellosos en ambas caras; ápice truncado-dentado, dientes 3-5, terminados en gruesos pelos glandulosos, de más o menos 1,5 mm de largo. Pétalos linear-oblongos de 7-9 mm de largo, por alrededor de 2 mm de ancho, vellosos por ambas caras, de color rojo; ápice levemente emarginado, con un grueso pelo glanduloso como continuación del nervio medio. Corona de 10-11 mm de alto, levemente dentado-obtusa en el ápice, de color purpúreo. Androginóforo de 5-5,5 mm de largo, glabro, ensanchado, anuliforme e hirsuto en el ápice. Estambres subexertos; filamentos de 13-15 mm de largo, vitiformes; anteras de 3,3-3,5 mm de largo; granos de polen prolatos (42-45 x 27-30 mic), tectum con perforaciones irregulares. Ovario cónico-obtuso, de 3-3,5 mm de alto, por 2,3-2,5 mm de diámetro basal, vellosos hacia el ápice; estilos más cortos que los estambres, de 10-11 mm de largo; estigmas obcónicos de alrededor de 1 mm de ancho, papilosos. Cápsula claviforme, cónico-piramidal en el ápice, de 16-19 mm de largo, esparcidamente hirsuta, dehiscente por tres valvas agudas de 8-9,5 mm de largo. Semillas numerosas obovadas, de 1,8-2 mm de largo, foveoladas, con finas costillas longitudinales y transversales (Ricardi 1967).</p>			
ASPECTOS REPRODUCTIVOS:			
No hay antecedentes sobre la propagación de estas plantas. Sin embargo, por sus características y lugares de crecimiento, cabe pensar que se puede propagar por semillas y multiplicar por esquejes (Riedemann et al. 2006)			
Distribución geográfica:			
Especie endémica de algunas quebradas de la precordillera de la Región de Tarapacá (Ricardi 1965, 1967). Se desarrolla al interior de los valles de Lluta y Azapa hasta los 2.500 m (Ricardi 1967, Riedemann et al. 2006). De acuerdo a los registros existentes hasta 1967 y concordantes con los que disponen hasta el presente, se trataría de un endemismo de área muy reducido (alrededor 18°30' S, en la Cuesta el Águila, Quebrada Cardones).			
Tabla 1: Registros de <i>Malesherbia auristipulata</i>			
Institución CONC = Herbario Universidad de Concepción MO = Missouri Botanical Garden SGO = Herbario Museo Nacional de Historia Natural			
**Ver figura 2 mapa distribución			

Registro N° S	Fecha	Localidad	Colector	Institución	Características sitio
1	01-09-1975	Poconchile	Dalannais G	SGO	Arbusto de flores rojas; erecta que crece en Aluviones, escasa
2	07-11-1995	Quebrada Los Cardones	Gengler K	SGO	Fire-engine red flowers, 50-80 cm tall, rare
3	07-05-2011	Quiborax			
4	03-03-1998	Valle de Lluta	Trivelli MA	SGO	Planta de 50 cm alto, flores fucsia. En un Solo lugar
5	06-05-2005	Planta de Bórax		CONC	Flor Roja
6	01-02-1965	Cardones		CONC	Muy escasa
7	14-07-1977	Quebrada Cardones		CONC	
8	27-12-1999	Planta El Águila	Muñoz M	SGO	Arbusto 60 cm con flores rojas, follaje oscuro; muy escasa
9	17-08-1995	Cuesta El Águila		CONC	
10	12-03-1998	Cuesta El Águila		CONC	
11	24-03-1961	Portezuelo de Chapiquiña	Ricardi SM	MO	
12	00-00-2006	Cuesta El Águila			
13	14-07-1977	Putre	Zöllner O	MO	
14	03-05-1972	Cuesta El Águila		CONC	
Extensión de la Presencia en Chile (km ²)=>				620	
Regiones de Chile en que se distribuye: Arica y Parinacota					
Territorios Especiales de Chile en que se distribuye:					
Países en que se distribuye en forma NATIVA: Chile					
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa, estructura y dinámica poblacional:					
Es una especie con una distribución muy restringida y muy escasa (Gengler-Novak 2002, Riedemann et al. 2006, E. Belmonte, comunicación personal, 2011)					
Preferencias de hábitat:					
Habita quebradas pedregosas de la precordillera de la región de Tarapacá (Ricardi 1965, 1967), hasta alrededor de 2.500 m. La mayoría de sus registros provienen de la Cuesta el Águila en el sector de Quebrada Cardones (Riedemann et al. 2006), donde comparte su hábitat con el cactus candelabro (<i>Browningia candelaris</i>). Crece en cursos someros y aluviones donde en algún momento hubo paso de agua (E. Belmonte, comunicación personal, 2011).					
Área de ocupación en Chile (km ²)=>				1	
Interacciones relevantes con otras especies:					
Visitada y presumiblemente polinizada por picafleres (E Belmonte, comunicación personal, 2011)					
Descripción de Usos de la especie:					
Medicina humana. Posee propiedades anti-microbianas, anti-inflamatorias antioxidantes y analgésicas (Erazo et al. 2006). Su propagación y uso paisajístico merece ser investigado para asegurar su supervivencia (Riedemann et al. 2006)					
Principales amenazas actuales y potenciales:					
Pérdida de Hábitat / Degradación (Causa antrópica)					
Estados de conservación vigentes en Chile para esta especie:					
Rara (Benoit 1989)					
Estado de conservación según UICN=>				No Evaluada (NE)	
Acciones de protección:					

Esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas de interés:

Además, esta especie tiene registro de presencia en las siguientes áreas (Área con prohibición de caza; Inmuebles fiscales destinados a conservación; Reserva de la biosfera; Sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad; Zona Interés Turístico, ZOIT):

Está incluida en la siguiente **NORMATIVA** de Chile:

Está incluida en los siguientes convenios internacionales:

Está incluida en los siguientes proyectos de conservación:

Propuesta del Comité de Clasificación (según criterios del Reglamento de Clasificación de Especies - RCE):

En la reunión del 7 de noviembre de 2012, consignada en el Acta Sesión N° 06, el Comité de Clasificación establece:

***Malesherbia auristipulata* Ricardi, “ají de zorra”, “piojillo”**

Sufrútice erecto de 40-80 cm de alto, leñoso, ramificado desde la base, hirsuto, glanduloso; pelos unicelulares finos de 0,5-1,2 mm de largo; pelos glandulosos rojizos de 0,8-1,2 mm de largo. Ramas muy hojosas, leñosas, de color pardo verdoso, de 4-7 mm de diámetro, cicraticosas o con restos de hojas muertas en la base, terminadas en racimos de flores.

Especie endémica de algunas quebradas de la precordillera de la región de Tarapacá. Se desarrolla al interior de los valles de Lluta y Azapa hasta los 2.500 m.

Luego de evaluar la ficha de antecedentes de la especie, el Comité, considera que no existen datos suficientes para utilizar los criterios “A”, “B”, “C” y “E”. Se consideró que por su área de ocupación menor a 20 km², la especie satisface el criterio “D” de UICN 3.1 para ser incluida en la categoría **VULNERABLE**. Se describe a continuación los criterios utilizados.

Propuesta de clasificación:

Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es:

VULNERABLE VU D2

Dado que:

D2 Su área de ocupación menor a 20 km². De tal manera que es propensa a los efectos de la actividad humana o a eventos fortuitos dentro de un período de tiempo muy corto en un futuro incierto, y es por consiguiente, capaz de cambiar a En Peligro Crítico (CR) e inclusive a Extinta (EX) en un período de tiempo muy corto.

Experto y contacto:

Sitios Web que incluyen esta especie:

<http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/DetalleEspecie.asp?forma=&variedad=&subespecie=&especie=auristipulata&genero=Malesherbia&espcod=76166>

Flora del Cono Sur: Catálogo de las Plantas Vasculares (2011)

http://www.ipni.org/ipni/advPlantNameSearch.do;jsessionid=504B489F78FD8B7E9F64C7ACF7527F55?find_family=malesherbiaceae&find_genus=malesherbia&find_species=auristipulata&find_infrafamily=&find_infragenus=&find_infraspecies=&find_authorAbbrev=&find_includePublicationAuthors=on&find_includePublicationAuthors=off&find_includeBasionymAuthors=on&find_includeBasionymAuthors=off&find_publicationTitle=&find_isAPNIRecord=on&find_isAPNIRecord=false&find_isGCIRRecord=on&find_isGCIRRecord=false&find_isILKRecord=on&find_isILKRecord=false&find_rankToReturn=all&output_format=normal&find_sortByFamily=on&find_sortByFamily=off&query_type=by_query&back_page=plantsearch

The International Plant Names Index (2011)

Bibliografía citada:

BENOIT IL (ed) (1989) Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Ministerio de Agricultura, Corporación Nacional Forestal, Santiago, Chile. 157 pp.

<p>ERAZO S, NEGRETE R, ZALDÍVAR M, BACKHOUSE N, BELMONTE E, ROJAS O, SAN MARTIN A, MASSON L, GARCÍA R & C DELPORTE (2006) Active metabolites and biological activities from <i>Malesherbia auristipulata</i>. <i>Pharmacologyonline</i> 3: 482-493.</p>
<p>GENGLER-NOWAK K (2002) Reconstruction of the Biogeographical History of Malesherbiaceae. <i>The Botanical Review</i> 68(1): 171-188</p>
<p>INSTITUTO DE BOTÁNICA DARWINION (2009) Flora del Cono Sur, Catálogo de las Plantas Vasculares. Academia Nacional de Ciencias Exactas, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), Argentina. URL: http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp (con acceso 19 de Octubre de 2010)</p>
<p>RICARDI M (1965) Estudios en Malesherbiaceae II. <i>Gayana Botanica</i> 12: 3-10</p>
<p>RICARDI M (1967) Revisión taxonómica de las Malesherbiáceas. <i>Gayana Botanica</i> 16: 3-139</p>
<p>RIEDEMANN P, ALDUNATE G & S TEILLIER (2006) Flora nativa de valor ornamental: identificación y propagación, Chile Zona Norte. Productora Gráfica Andros Limitada, Chile. 404 pp</p>
<p>THE INTERNATIONAL PLANT NAME INDEX (2010) Plant Name Query. International Plant Name Index (online) .URL: http://www.ipni.org/ipni/plantnamesearchpage.do (accessed November 9, 2010)</p>

Imágenes



Figura 1: *Malesherbia auristipulata* (Fuente: Eliana Belmonte)

Figura 2. Mapa de distribución confeccionado por MMA a partir de datos consultoría realizada por Fauna Australis 2011

(ver datos de puntos en tabla1).

