

Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain.

1. Nomenclatura

Nombre campo	Datos
Reino	Fungi
Phyllum o División	Ascomycota
Clase	Lecanoromycetes
Orden	Peltigerales
Familia	Lobariaceae
Género	<i>Pseudocyphellaria</i>
Nombre científico	<i>Pseudocyphellaria aurata (Ach.) Vain.</i>
Autores especie	Vainio
Referencia descripción especie	Vainio (1890) Acta Soc. Fauna Flora fenn. 7(no. 1): 183.
Sinonimia valor	<i>Sticta aurata</i> Ach.
Sinonimia autor	Acharius
Sinonimia bibliografía	Acharius, E. 1803. Methodus qua Omnes Detectos Lichenes Secundum Organa Carpomorpha ad Genera, Species et Varietates Redigere atque Observationibus Illustrare Tentavit Erik Acharius. :1-394
Sinonimia valor	<i>Crocodia aurata</i> (Ach.) Link
Sinonimia autor	Link
Sinonimia bibliografía	Link, H.F. 1833. Handbuch zur Erkennung der nutzbarsten und am häufigsten vorkommenden Gewächse. :1-536
Sinonimia valor	<i>Lichen auratus</i> (Ach.) Sm.
Sinonimia autor	Smith
Sinonimia bibliografía	Smith JE & J SOWERBY (1812) English Botany 33: tab. 2359
Sinonimia valor	<i>Lobaria aurata</i> (Ach.) Kuntze
Sinonimia autor	Kuntze
Sinonimia bibliografía	Kuntze, O. 1898. Revisio generum plantarum. 3(2):1-576
Sinonimia valor	<i>Nephroma aurata</i> (Ach.) Pers.
Sinonimia autor	Persoon
Sinonimia bibliografía	Gaudichaud-Beaupré C (1827) Voyage autour du Monde, Entrepis par Ordre du Roi, Exécuté sur les Corvettes de S.M. l'Uranie et la Physicienne. Botanique (Nagpur). 5:161-208
Sinonimia valor	<i>Parmelia aurata</i> (Ach.) Eschw.
Sinonimia autor	Eschweiler
Sinonimia bibliografía	Eschweiler F G (1833) Lichenes. In: Martius,C F P von: Flora Brasiliensis seu enumeratio plantarum in Brasilia etc. provenientium. 1, Pars prima. Algae, Lichenes, Hepaticae. \Tübingen, pp. 51-293.
Sinonimia valor	<i>Parmosticta aurata</i> (Ach.) Nyl.
Sinonimia autor	Nylander
Sinonimia bibliografía	Nylander W (1875) Addenda nova ad lichenographiam Europaeam. Contin. XXI. Flora (Regensburg). 58:297-303
Nombre común	SIN INFORMACIÓN
Idioma	SIN INFORMACIÓN
Nota taxonómica	

2. Descripción

Descripción	Talo orbicular a irregular, suave o fuertemente adherido al sustrato, de hasta 15 cm de diámetro, corticola. Lobulos de 3-12 mm de ancho y de hasta 30 mm de largo, ramificación irregular, anchos redondeados a indentados, discretos en los márgenes aimbricados en el centro, márgenes ligeramente engrosados en la cara inferior, enteros, sinuosos, con pseudocifelas o con soralias erodados a lineares. Superficie superior de un color verde lechuga brillante cuando húmedos, de color oliva oscuro cuando secos, a veces tornándose rojizos en el herbario, suaves, coriáceos, escábridos areolados hacia los márgenes, undulado a ligeramente arrugados, con algunas grietas de las que a veces surgen pequeños lobulillos regenerados. Soralia amarilla, granulos agrupados en soralias marginales, lineares, elongados y sinuosos, usualmente erosionando los márgenes inferiores del lóbulo, mas o menos revolutos, convolutos o ascendentes, pocas veces esparciéndose sobre la superficie superior. Medula amarilla, fotobionte un alga verde. La superficie inferior es amarillenta a rosado-amarillenta, con arrugas irregulares, tomentosa hacia los márgenes, el tomento delgado, sedoso, blanquecino o rosado en los márgenes, más denso, grueso y oscuro hacia el centro, llegando a una tonalidad café oscura a chocolate. Pseudocifelas amarillas, numeroas, mas o menos redondeadas de hasta 0,5 mm de diámetro, más o menos elevadas, área sin corteza plana, al mismo nivel o ligeramente bajo el nivel del tomento. Sin apotecios (Galloway 1992, Galloway 2007).
Descripción Simple	Talo orbicular a irregular, suave o fuertemente adherido al sustrato, de hasta 15 cm de diámetro, corticola. Lobulos de 3-12 mm de ancho y de hasta 30 mm de largo, ramificación irregular, anchos redondeados a indentados, a veces elevados a revolutos, márgenes ligeramente engrosados en la cara inferior, enteros, sinuosos, con pseudocifelas o con soralias erodados a lineares. Superficie superior de un color verde lechuga brillante cuando húmedos, de color oliva oscuro cuando secos, suaves, coriáceos, escábridos areolados hacia los márgenes, con algunas grietas de las que a veces surgen pequeños lobulillos regenerados. Soralia amarilla, marginales, lineares, elongados y sinuosos, usualmente erosionando los márgenes inferiores del lóbulo, más o menos revolutos, convolutos o ascendentes, pocas veces esparciéndose sobre la superficie superior. Medula amarilla, fotobionte un alga verde. La superficie inferior es amarillenta a rosado-amarillenta, con arrugas irregulares, tomentosa de color oscuro al centro y claro hacia el borde. Pseudocifelas amarillas, numerosas, redondeadas, más o menos elevadas. Sin apotecios.
Rasgos distintivos	Se caracteriza por la soledia en soralias marginales y sinuosos, la medula amarilla y las pseudocifelas amarillas.
Rasgos distintivos (simple)	Se caracteriza por la soledia en soralias marginales y sinuosos, la medula amarilla y las pseudocifelas amarillas.

3. Historia Natural

Hábito (sólo para plantas)	NO APLICA
Comportamiento (sólo para animales)	NO APLICA
Reproducción en Chile	SI
Reproducción	Solo se conoce la presencia de estructuras de dispersión vegetativa en forma de soledios (Galloway 1992).

Reproducción simple	Dispersión vegetativa por soredios.
Tipo de Alimentación	NO APLICA
Dieta	NO APLICA
Dieta simple	NO APLICA
Interacciones Relevantes	SIN INFORMACIÓN
Especie Interacción	SIN INFORMACIÓN
Hábitat	Sobre corteza y ramas de diferentes especies, en algunos sectores costeros incluso es posible verla sobre rocas, prefiriendo zonas abiertas o expuestas.
Hábitat SIMPLE	Sobre corteza y ramas de diferentes especies, en algunos sectores costeros incluso es posible verla sobre rocas, prefiriendo zonas abiertas o expuestas.

4. Distribución y demografía.

Países donde se distribuye en forma natural	
País	Argentina
País	Australia
País	Bután
País	Bolivia
País	Brasil
País	Chile
País	China
País	Colombia
País	Costa Rica
País	Ecuador
País	El Salvador
País	España
País	Estados Unidos
País	Filipinas
País	Guatemala
País	Indonesia
País	Kenia
País	Madagascar
País	Malaysia
País	México
País	Nueva Caledonia
País	Nueva Zelandia
País	Panamá
País	Papua Nueva Guinea

País	Perú																																			
País	Portugal																																			
País	Puerto Rico																																			
País	Sudáfrica																																			
País	Taiwán																																			
País	Tanzania																																			
País	Uruguay																																			
País	Venezuela																																			
País	Vietnam																																			
País	Yemen																																			
País	Zimbawe																																			
Países donde se distribuye en forma exótica																																				
País	SIN INFORMACIÓN																																			
Origen especie respecto de Chile	NATIVA																																			
Endémico de Chile	NO																																			
Distribución	Especie pantropical, en Chile se le conoce del Archipiélago de Juan Fernández y de localidades aisladas en la región de Antofagasta (Cerro Moreno) y la región de Coquimbo (PN Fray Jorge). A continuación, se muestra un ejemplo de Tabla de distribución y datos relevantes de la especie. (ésta se construye a partir de la tabla de atributos del shapefile) <table><tr><th>Registro N_S</th><th>Año</th><th>Colector</th><th>Determinador</th><th>Nombre de la Localidad</th><th>Elevación (m)</th><th>Fuente</th></tr><tr><td>1(1022)</td><td>1967</td><td></td><td>FOLLMANN 1967</td><td>Cerro Moreno.</td><td>1131</td><td>FOLLMANN 1967</td></tr><tr><td>2(1023)</td><td>1972</td><td></td><td>FOLLMANN G & J REDÓN 1972</td><td>PN Fray Jorge</td><td>633</td><td>FOLLMANN & REDÓN 1972</td></tr><tr><td>3(147)</td><td>1965</td><td>Imshaug, Henry A</td><td></td><td>Pared NE de El Yunque</td><td>549</td><td>MSC</td></tr><tr><td>4(149)</td><td>1965</td><td>Imshaug, Henry A</td><td></td><td>Mas Afuera; Quebrada de las Vacas:)</td><td>337</td><td>MSC</td></tr></table> MSC= Michigan State University (EEUU)	Registro N_S	Año	Colector	Determinador	Nombre de la Localidad	Elevación (m)	Fuente	1(1022)	1967		FOLLMANN 1967	Cerro Moreno.	1131	FOLLMANN 1967	2(1023)	1972		FOLLMANN G & J REDÓN 1972	PN Fray Jorge	633	FOLLMANN & REDÓN 1972	3(147)	1965	Imshaug, Henry A		Pared NE de El Yunque	549	MSC	4(149)	1965	Imshaug, Henry A		Mas Afuera; Quebrada de las Vacas:)	337	MSC
Registro N_S	Año	Colector	Determinador	Nombre de la Localidad	Elevación (m)	Fuente																														
1(1022)	1967		FOLLMANN 1967	Cerro Moreno.	1131	FOLLMANN 1967																														
2(1023)	1972		FOLLMANN G & J REDÓN 1972	PN Fray Jorge	633	FOLLMANN & REDÓN 1972																														
3(147)	1965	Imshaug, Henry A		Pared NE de El Yunque	549	MSC																														
4(149)	1965	Imshaug, Henry A		Mas Afuera; Quebrada de las Vacas:)	337	MSC																														
Distribución SIMPLE	Pantropical, en Chile en el archipiélago de Juan Fernández, Cerro Moreno y el PN Fray Jorge.																																			
Distribución altitudinal (msnm)	337 a 1131																																			
Distribución regional dentro de Chile																																				
Región	Antofagasta																																			
Situación	Presente																																			
Región	Coquimbo																																			
Situación	Presente																																			
Región	Valparaíso																																			
Situación	Presente																																			

SUPERFICIE ÁREA DE OCUPACIÓN (km2)	Para el cálculo del área de ocupación se utilizó el método de la IUCN (grilla con cuadrículas de 2 x 2 km,) contabilizando aquellas cuadrículas que se intersectan con los puntos de registros y colectas de la especie. Lo que resultó en una superficie de 44 km2.
PRESENCIA EN ÁREAS PROTEGIDAS (SI/NO/SIN INFORMACIÓN)	SI; Parque Nacional (PN): Bosque Fray Jorge (2) Parque Nacional (PN): Archipiélago Juan Fernández (3) Parque Nacional (PN): Archipiélago Juan Fernández (4)
PRESENCIA EN ÁREAS CON PROTECCIÓN	NO

5. Demografía.

Información poblacional	SIN INFORMACIÓN
Información poblacional SIMPLE	SIN INFORMACIÓN

6. Estado de conservación

Clasificada nacionalmente según Estado Conservación	NO
Esta Vigente	SI
Categoría	Peligro de Extinción
Fuente Categoría Actual	Boletín 47
Referencia de la Clasificación	QUILHOT W, I PEREIRA, G GUZMÁN, R RODRÍGUEZ & I SEREY (1998) Categorías de conservación de líquenes nativos de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 9-22.
N° Proceso de RCE	
Año clasificación	1998
Zona de Aplicación	II (cerro Moreno), IV (Fray Jorge) y Archipiélago de Juan Fernandez.
Criterios RCE	Quilhot et al. (1998) indican cambio climático

7. Categoría de Conservación asignada Internacional (UICN).

Clasificación Internacional según UICN	NO EVALUADA (NE)
--	------------------

8. Amenazas.

Efectos de la especie	NO APLICA
Tipo de Amenazas sobre la especie	Cambio climático
Descripción de Amenazas sobre la especie	Cambio climático
Descripción de Amenazas sobre la especie SIMPLE	Cambio climático

9. Normativa.

Normativa regulación	SIN INFORMACIÓN
Incluida en algún Convenio Internacional	NO
Nombre del o los Convenios o Acuerdos Internacionales (señalar apéndice del acuerdo)	

10. Usos y manejos.

Listado de las formas de uso	SIN INFORMACIÓN
Descripción de usos	SIN INFORMACIÓN
Descripción de usos SIMPLE	SIN INFORMACIÓN

11. Conservación/Investigación.

Nombre de proyectos, programas, investigación, etc, desarrollados con la especie	
Nombre del proyecto	SIN INFORMACIÓN
Objetivo	SIN INFORMACIÓN
Tipología de proyecto	SIN INFORMACIÓN
Institución ejecutora	SIN INFORMACIÓN
Datos de contacto	SIN INFORMACIÓN
Periodo de desarrollo	SIN INFORMACIÓN

12. Bibliografía.

Nombre completo de la publicación	QUILHOT W, I PEREIRA, G GUZMÁN, R RODRÍGUEZ & I SEREY (1998) Categorías de conservación de líquenes nativos de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 9-22.
Año de la publicación	1998
Tipo de publicación	(a) Artículo de Revista
Forma de citar dentro de textos	Quilhot et al. 1998
Nombre completo de la publicación	GALLOWAY DJ (2007) Flora of New Zealand Lichens. Revised Second Edition Including Lichen-Forming and Lichenicolous Fungi. Volumes 1 and 2. Lincoln. 2.261 pp.
Año de la publicación	2007
Tipo de publicación	(c) Libro
Forma de citar dentro de textos	Galloway 2007
Nombre completo de la publicación	GALLOWAY DJ (1992) Studies in Pseudocyphellaria (lichens) III. The South American species. Bibliotheca Lichenologica 46: 1-275.
Año de la publicación	1992
Tipo de publicación	(a) Artículo de Revista
Forma de citar dentro de textos	Galloway 1992

Experto	SIN INFORMACIÓN
---------	-----------------

13. Multimedia e imágenes.

Imagen de la especie	
Nombre del archivo	Pseudocyphellaria_aurata_1.JPG
Restricciones a la difusión de la imagen	Sin restricción
Nombre del autor de la misma	Reinaldo Vargas Castillo
Correo electrónico del autor	reinaldovargas@gmail.com

Imagen de la especie	
Nombre del archivo	Pseudocyphellaria_aurata_2.JPG
Restricciones a la difusión de la imagen	Sin restricción
Nombre del autor de la misma	Reinaldo Vargas Castillo
Correo electrónico del autor	reinaldovargas@gmail.com

Imagen de la especie	
Nombre del archivo	Pseudocyphellaria_aurata_3.JPG
Restricciones a la difusión de la imagen	Sin restricción
Nombre del autor de la misma	Reinaldo Vargas Castillo
Correo electrónico del autor	reinaldovargas@gmail.com

LINK a páginas WEB de interés	http://www.mycobank.org/
Descripción link	Base de datos nomenclaturales y asociados (referencia a la descripción, entre otros).
LINK a páginas WEB de interés	https://lichenportal.org/cnalh/
Descripción link	Base de datos integrada de herbarios de líquenes de Norteamérica (incluyendo algunos países de Europa).
Videos	SIN INFORMACIÓN
Descripción video	SIN INFORMACIÓN

Audio	SIN INFORMACIÓN
Descripción video	SIN INFORMACIÓN

14. Observaciones.

Observación 1 (propuesta de clasificación del consultor)	
Observación 2 (sugerencias y observaciones que no se pueden incluir en los campos anteriores, como por ejemplo las clasificaciones regionales)	