

## FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Nombre Científico	Nombre Vernacular
<i>Puffinus creatopus</i> (Coues) ITIS Taxonomic Serial No.: 174547	Fardela blanca

### Sinonimia

### Antecedentes Generales

Largo: 48 cms.

Cabeza, lados del cuello y partes superiores gris oscuro algo parduzco. Partes ventrales blancas, algunas aves con bordeado gris más intenso hacia el abdomen. Raya blanca bajo el ojo. Subcaudales y subalares blancas rayadas de grisáceo. Pico rosado suave con punta negruzca. Patas rosadas.

<http://www.avesdechile.cl>

### Distribución geográfica (extensión de la presencia)

Aguas marinas entre Arica y Chiloé. Nidificante endémico de Chile, en el archipiélago de Juan Fernández y en la isla Mocha. <http://www.avesdechile.cl>

De acuerdo a

<http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3931&m=1>

La especie tiene una extensión de la presencia de 21,550,000 km<sup>2</sup>. Sin embargo el área de nidificación es de menos 150 km<sup>2</sup>.

*Puffinus creatopus* es un ave del pacífico oriental que anida sólo en Róbinson Crusoe (*a few thousand pairs in 1986 and 2,750 occupied burrows in 2002*) in el Archipiélago de Juan Fernández y en la Isla Mocha (*13,000-17,000 pairs, but possibly up to 25,000 pairs*), en la costa de Arauco, combinando los sitios debería haber unas 20.000 parejas, que podrían implicar unos 100.000 individuos. Estas poblaciones están declinando.

Ibarra-Vidal y Klesse (1994) documentan que la colonia reproductiva de esta especie en la isla Santa Clara se perdió debido a un aluvión.

### Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional

<http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMDetails.asp&sid=3931&m=1>

documenta que existen unos 100.000 individuos maduros en el 2004 y señala que la calidad de los datos es mediana.

### Tendencias poblacionales actuales

La misma fuente señala que la tendencia de la población es desconocida con sólo tres poblaciones conocidas, de ellas la que más individuos tiene alcanza los 4000 especímenes.

### Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)

La especie es eminentemente marina, de hábitos pelágicos, anida en la isla Mocha, en la Octava Región administrativa, Robinson Crusoe y Santa Clara en el archipiélago de Juan Fernández.

### Principales amenazas actuales y potenciales

<http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpchTMDetails.asp&id=3931&m=1>

indica que existe mortalidad accidental, debido a pesquerías, que existe una pérdida del hábitat, que existe caza sobre la especie y que hay especies invasoras que afectan directamente a los individuos, además de polución, todos ellos operando simultáneamente y de manera continua.

Existe la práctica en isla Mocha de captura de los pollos aún en los nidos ya que alcanzan pesos superiores a los de un adulto debido a la grasa que acumulan; a esta grasa se le atribuyen ciertas propiedades salutíferas y nutricionales puesto que su consumo previene los resfriados, catarros y otras afecciones.

### Estado de conservación

Estos son los estados de conservación que se le han asignado:

Year	Category
2006	Vulnerable
2004	Vulnerable
2000	Vulnerable
1994	Vulnerable
1988	Threatened

Según UICN 2000 Vulnerable por D2

<http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpchTMDetails.asp&sid=3931&m=1> considera que está Vulnerable, por D2, argumentando “This species has a very small breeding range at only three locations, which renders it susceptible to stochastic events and human impacts. If invasives and harvesting of chicks are found to be causing population declines already, then the species would warrant uplisting to Endangered.”

### Bibliografía citada revisada

IBARRA-VIDAL, H. y C. KLESSE. 1994.) Nota sobre la fardela blanca (*Puffinus creatopus*, Coues, 1864) (Aves, Procellariidae) de la Isla Mocha, VIII Región, Chile. Comunicaciones del Museo de Historia Natural de Concepción (Chile) 8: 49-54.

### Bibliografía citada NO revisada

**Sitios Web citados**

<http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpchTMDetails.asp&id=3931&m=1>

<http://www.avesdechile.cl>



Tomado de <http://www.avesdechile.cl/432a.jpg>



tomado de

[http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMLDetails.a  
sp&sid=3931&m=0](http://www.birdlife.org/datazone/species/index.html?action=SpcHTMLDetails.asp&sid=3931&m=0)

### **Propuesta de Clasificación**

Se concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es:

#### **EN PELIGRO EN B2ab(ii,iii)**

Dado que:

B2 El área de ocupación estimada es menos de 500 km<sup>2</sup>,  
B2a, está severamente fragmentado o se sabe que no existe en más de cinco localidades,  
y que se verifica que hay una,  
B2b(ii,iii), disminución continua observada en el área de ocupación, en el área, extensión  
y calidad del hábitat.

Si bien la especie ocupa 21 millones de kilómetros cuadrados, su área de nidificación es de 150 kilómetros cuadrados. En opinión de estos consultores un área de esa magnitud conocida como únicas para la nidificación, constituyen territorios claves y limitantes de la especie.