

FICHA RESUMEN DE ESPECIE

Nombre Científico	Nombre Vernáculo
<i>Tristagma subbiflorum</i> (Colla) Ravenna, Plant Life 34: 135. 1978.	
Familia: ALLIACEAE	

Sinonimia
<i>Allium subbiflorum</i> Colla, Herb. Pedem. 5: 388. 1836; <i>Triteleia berteri</i> Kunth, Enum. Pl. 4: 467. 1843; <i>Nothoscordum subbiflorum</i> (Colla) Walp., Ann. Bot. 3: 636. 1852-53; <i>Brodiaea subbiflora</i> (Colla) Baker, Gard. Chron. n. s. 2: 459. 1896.

Antecedentes Generales
Bulbo solitario, ovado-oblongo, sólido, de 1,5 cm de largo, imbricado-tunicado, túnica interior blanquecina a grisácea, planta inodora, la parte inferior con raicillas. Hojas 3-8, todas radicales, erectas, linear, aguda, glabras, planas, sin venas notorias, con vaina escariosa, subentera. Espata profundamente bivalva, linear-lanceolada, 6-8 x 2 mm, muy agudas, escariosas, persistentes, (1-) 2(-3) flores, ubicadas en el centro de la espata, cortamente pediceladas y de largo desigual, pedicelo filiforme, nunca sobrepasando las espatas. Perigonio campanulado, 6-partido hasta la base, de 1,3 cm de largo, segmentos ovado-lanceolado, subiguales, subagudos, carinados, con 3 líneas notorias. Estambres 6; filamentos insertos en la base de los tépalos, subiguales; antera oblonga. Ovario ovado, subtrígono, trilocular, 3-valvado; estilo filiforme un poco más largo que los estambres; estigma simple.

Distribución geográfica (extensión de la presencia)
Especie endémica de la Región de Valparaíso. Las Tablas y Pernales, Valparaíso.

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional
No existe información disponible.

Tendencias poblacionales actuales
Se desconocen las tendencias actuales.

Preferencias de hábitat de las especies (área de ocupación)
Crece en lugares arenosos de las tablas.

Principales amenazas actuales y potenciales
Colecta, destrucción de hábitat, herbivoría

Propuesta de Clasificación
Este Comité, en reunión del 26 de mayo de 2010, concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE), es: EN PELIGRO CRÍTICO CR B1ab(iii) Dado que: B1 Extensión de presencia menor a 100 km². Estimada inferior a 10 km². B1a Se conoce en una sola localidad. Conocida en una localidad. B1b(iii) Disminución en la calidad del hábitat, por pastoreo de caprinos y mulares en el hábitat hiperárido de esta especie.

Bibliografía citada revisada

Baker, J.G. 1896. Thr genus *Brodiaea* and its allies. Gard. Chron., ser. 3, 20: 459.

Colla, L.A. 1836. Herbarium pedemontanum juxta methodum naturalem dispositum additis nonnullis stirpibus exoticis ad universos ejusdem methodi ordines exhibendos. Augustae Taurinorum 5: 388.

Colla, L.A. 1837. Plantae rariores in regionibus chilensibus a cl. °M.D. Bertero nuper detectae et ab A. Colla in lucem editae. Mem. Reale Accad. Sci. Torino 39 (7): 1-55, 28 lám.

Kunth, C.S. 1843. Tomus quartus. Enumeratio Plantarum 4, 732 pp.

Ravenna, P. 1978. Studies in Allieae II. Plant Life 34: 130-151.

Walpers, W.G. 1852-53. Annales botanices systematicae, vol. 3, 1168 pp.

Sitios Web citados

--

