

FICHA PAC DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Aviso: Estas fichas de antecedentes corresponden a los datos que tuvo a la vista el Comité de Clasificación en el momento de su evaluación. Estas fichas son de tres tipos:
INICIO: Ficha elaborada principalmente por autor (Inicio del proceso de clasificación).
PAC: Ficha revisada por Comité, corregida y que incorpora la propuesta preliminar de clasificación del Comité (Participación ciudadana del proceso de clasificación)
FINAL: Ficha revisada por la ciudadanía y por el Comité, que incorpora la propuesta definitiva del Comité (Clausura del proceso de clasificación).
La ficha FINAL es la que se debe revisar para conocer el resultado definitivo de la clasificación de cada especie en cada proceso.

Nombre científico
<i>Pluteus flammipes</i> E. Horak (1964)
Nombre común
Plúteo de fuego (nomb. prop.)




Figura 1: Fotografías de los basidiomas de *Pluteus flammipes* en A) y B) su sustrato, y C) y D) detalles en otros ángulos. (Fotografías de Bella Romero y María José Dibán).

Propuesta de preliminar de clasificación del Comité de Clasificación
En la reunión del 18 de abril de 2023, consignada en el Acta Sesión N° 01, del 19no proceso, el Comité de Clasificación establece:
<i>Pluteus flammipes</i> E. Horak (1964), “plúteo de fuego” (nomb. prop.)
Hongo con Píleo de 6-28 mm de diámetro, acampanado a aplanado, con o sin

presencia de mamelón, radial- y finamente estriado, seco, marrón rojizo, más oscuro hacia el interior, bordes de color anaranjado, ligeramente dentados con la edad. Láminas blancas en los ejemplares inmaduros que se tornan fuertemente anaranjadas, y, luego más oscuras y brillosas, libres, densas. Estípites de 12-55 x 1-3 mm, céntrico, cilíndrico, a veces curvo, finamente alargado y estriado, amarillo anaranjado, más oscuro hacia la base, purinoso, con presencia de micelio basal blanco poco desarrollado. Es una especie endémica, y cuenta con registros desde Bullileo (Región del Maule) hasta Llanquihue (Región de Los Lagos), asociado principalmente a bosque esclerófilo y bosque templado. El Comité estima que no cumple con ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se destaca el hecho que crece en matorral esclerófilo y espinoso, el que se asume como aumentando por pérdida de bosque esclerófilo. Sufre amenazas por la degradación del bosque nativo producto de la fuerte presión antrópica como cambio de uso de suelo, incendios forestales, tala del bosque y sequías prolongadas, sobre todo en la zona central que es representada por el bosque esclerófilo. Respecto al criterio B no cumple con los umbrales de superficies, por lo que tampoco podría ser considerada amenazada bajo este criterio, implica clasificarla como Preocupación Menor (LC). Respecto a los criterios A, C, D y E no hay información suficiente para definir alguna categoría por lo se la clasificaría como Datos Insuficientes (DD). Se concluye clasificarla según el RCE, como Preocupación Menor (LC). Se describe a continuación los criterios utilizados y las categorías por cada criterio asignadas preliminarmente:			
Criterio UICN	Criterios definitorios	Categoría Preliminar	Enunciación de Criterios
A		DD	-
B	***	LC	-
C		DD	-
D		DD	-
E		DD	-
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (RCE) es: PREOCUPACIÓN MENOR (LC) Dado que: NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable) y su amplia distribución indica que no está próxima a satisfacer los criterios.			

Taxonomía			
<i>Pluteus flammipes</i> E. Horak (1964)			
Reino:	Fungi	Orden:	Agaricales
Phyllum/División:	Basidiomycota	Familia:	Pluteaceae
Clase:	Agaricomycetes	Género:	<i>Pluteus</i>
Sinonimia			
<i>Pluteus flammipes</i> var. <i>flammipes</i> E. Horak, 1964			

Antecedentes Generales
ASPECTOS MORFOLÓGICOS
Píleo de 6-28 mm de diámetro, acampanado a aplanado, con o sin presencia de mamelón, radial- y finamente estriado, seco, marrón rojizo, más oscuro hacia el interior, bordes de color anaranjado, ligeramente dentados con la edad. Láminas blancas en los ejemplares inmaduros que se tornan fuertemente anaranjadas, y, luego más oscuras y brillosas, libres, densas. Estípite de 12-55 x 1-3 mm, céntrico, cilíndrico, a veces curvo, finamente alargado y estriado, amarillo anaranjado, más oscuro hacia la base, purinoso, con presencia de micelio basal blanco poco desarrollado. Contexto gris pardo rojizo en píleo y amarillo en el estípite. Olor y sabor no característicos. Características químicas, la epicutis no reacciona con KOH, y presenta fluorescencia marrón rojizo a burdeo oscuro. Esporada rosada. Esporas de 6-7 x 5-6 µm, ampliamente elípticas, con paredes delgadas, sin poro germinativo, hialinas, no amiloides. Basidios de 25-28 x 6-8 µm, tetrasporados, hialinos. Pleuro- y Queilocistidios de 40-74 x 7-24 µm, fusiformes bulbosos a fusiformes con forma de botella, hialinos, con paredes delgadas. Cutícula de hifas claviformes con pigmento marrón ocre (Modificado según Garrido 1988).
ASPECTOS REPRODUCTIVOS
Forma fructificaciones efímeras durante las temporadas de otoño e invierno, desarrollándose sobre madera en descomposición, tumbada o enterrada. En el himenóforo laminar se encuentran los basidios (esporangios). Cada basidio produce 4 esporas haploides mediante meiosis y cariogamia, las cuales son liberadas al medio y dispersadas por el agua, el viento y posiblemente por pequeños invertebrados del <i>Phylum</i> Arthropoda. Las esporas germinan y forman el micelio primario haploide y cuando se juntan dos micelios compatibles se fusionan mediante somatogamia para formar el micelio secundario que es diploide. Este micelio es el que forma los basidiomas cuando existen las condiciones apropiadas.

Distribución geográfica (extensión de la presencia)						
Es una especie endémica, y cuenta con registros desde Bullileo (Región del Maule) hasta Llanquihue (Región de Los Lagos), asociado principalmente a bosque esclerófilo y bosque templado. Sin embargo, hay algunos registros fotográficos en el bosque esclerófilo costero en la Región de Valparaíso en la plataforma de iNaturalist, que no están colectados, y por la misma razón, no han sido confirmados con microscopía, por lo que para evitar confusión con <i>Cryptotrama hygrociboides</i> no se incluyeron en esta ficha.						
Registro N_S	Año	Colector	Determinador	Nombre de la Localidad	Elevación (m)	Fuente
1	2017	M.J. Dibán	M.J. Dibán	Bullileo, Región del Maule	800	iNaturalist 87007195
2	2021	E. Thielemann	G. Cartes, M.J. Dibán	Concepción, Región del Biobío	7	iNaturalist 86458873
3	2021	G. Palfner; C. Araneda	G. Palfner	Hualpén, Región del Biobío	40	Com. Pers. Götz Palfner
4	2022	M. Aguirre	C. Valdés Reyes	Cascada Rocoto, Región del Biobío	20	iNaturalist 118952573
5	2018	C. Riquelme	M.J. Dibán	Concepción, Región del Biobío	130	iNaturalist 16386308
6	1982	N. Garrido	N. Garrido	Roblerías, Curanilahue, Región del Biobío	30	Garrido 500 (ZT, M)
7	1982	N. Garrido	N. Garrido	Parque Nacional Nahuelbuta, Región de la Araucanía	No específica	Garrido 453 (ZT, M)

8	2022	B. Romero	B. Romero, M.J. Dibán	El Manzanar, Región de la Araucanía	450	iNaturalist 115487300
9	1982	N. Garrido	N. Garrido	Puyehue, Región de Los Ríos	No específica	Garrido (1988)
10	1982	N. Garrido	N. Garrido	Anticura, Región de Los Lagos	No específica	Garrido (1988)
11	1963	E. Horak	E. Horak	Valle del río Gol-Gol, Región de Los Lagos	No específica	Garrido (1988)
12	1982	N. Garrido	N. Garrido	Antillanca, Región de Los Lagos	No específica	Garrido (1988)
13	1982	N. Garrido	N. Garrido	Frutillar, Región de Los Lagos	No específica	Garrido (1988)
14	1967	R. Singer	R. Singer	Llanquihue, Región de Los Lagos	No específica	M 6799 (SGO)

ZT = Herbario de la ETH, Zúrich, Suiza.
Com. Pers. = Registro fotográfico verificado y validado por especialista.
iNaturalist = Registro georeferenciado en la plataforma, fotografiado y validado por experto.

En la figura 3 se muestra el mapa de distribución de la especie.
Área de ocupación (AO): 56 km²
Extensión de la presencia (EP): 55.576 km²

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional
Se desconocen estos atributos, tampoco son mencionados en la literatura. Además, debido a su crecimiento principalmente microscópico, no es posible contabilizar el número de ejemplares que emergerá del sustrato donde se encuentra el micelio. Sin embargo, al fructificar suele crecer de forma solitaria al interior del bosque nativo, en sectores sombríos y húmedos.

Tendencias poblacionales actuales
No aplica para hongos por limitaciones metodológicas en la discriminación de individuos, por otra parte, no todos los registros detallan la cantidad de basidiomas, ni tampoco se les ha realizado seguimiento durante distintas temporadas a las localidades para determinar el aumento o disminución de la población. Sin embargo, los impactos en su hábitat pueden afectar en su población. Esta especie se distribuye principalmente en el bosque esclerófilo y bosque templado lluvioso, los cuales presentan las siguientes amenazas:
Bosque Esclerófilo: representado por Bullileo. Corresponde a la vegetación predominante de Chile central que agrupa varias de las asociaciones vegetales propias de la zona llamada mesomórfica o mediterránea del país, se distribuye desuniformemente en ambas cordilleras y el llano central. La gran mayoría de su superficie está actualmente cubierta por extensos campos de cultivos agrícolas, plantaciones frutales, viñedos, plantaciones forestales, y potreros de ganado, así como también expuestas a grandes sequías en los últimos años, además de ser un bosque altamente fragmentado, debido a la expansión inmobiliaria y ganadera (Modificado según Altamirano & Lara 2010, Donoso 1981, Fuentes <i>et al.</i> 1984, Garreaud <i>et al.</i> 2020, Miranda <i>et al.</i> 2020, Pisano 1954).
Bosque Templado Lluvioso: representado por la mayoría de las localidades de su distribución. Estos bosques han sido degradados, donde ha disminuido el porcentaje de bosque maduro en más del 40% entre los años 1986 y 2006, principalmente por cambio de uso de suelo, como agricultura y ganadería (Echeverría <i>et al.</i> 2012, y Miranda <i>et al.</i> 2017).

Preferencias de hábitat de la especie (área de ocupación)
Es una especie endémica, saprótrofa y lignícola que se desarrolla

principalmente sobre madera y corteza en descomposición de <i>Nothofagus</i> spp., como <i>N. obliqua</i> , también en especies esclerófilas y tallos descompuestos de <i>Chusquea</i> spp. Prefiere los lugares húmedos y sombríos.
Área de ocupación
Al considerar una cuadrícula de 4 km ² , el área de ocupación de la especie es de 56 km ² .
Al proyectar el área en Chile, se obtiene un área probable de extensión de 55.576 km ²

Principales amenazas actuales y potenciales
Es una especie endémica que se desarrolla en especies esclerófilas y de <i>Nothofagus</i> spp. Las amenazas que presenta esta especie están relacionadas a la degradación del bosque nativo producto de la fuerte presión antrópica como cambio de uso de suelo, incendios forestales, tala del bosque, el cambio climático y sequías prolongadas, sobre todo en la zona central que es representada por el bosque esclerófilo. Además, se ha documentado que ha disminuido el porcentaje de bosque templado maduro en más del 40% entre los años 1986 y 2006, principalmente por la agricultura y ganadería (Echeverría <i>et al.</i> 2012, y Miranda <i>et al.</i> 2017)
En el bosque esclerófilo se extrae hojarasca del suelo para su uso comercial (Fuentes <i>et al.</i> , 2014), por lo que se ve afectada toda la materia orgánica presente y, por lo tanto, los hongos descomponedores que allí habita. Esto, sumado a la megasequía en la zona central de los últimos 10 años (Garreaud <i>et al.</i> 2020), aumenta la amenaza que presentan estos bosques y todas las especies que albergan.

Estado de conservación
No Evaluada (NE) Se ha registrado en las siguientes áreas protegidas: Parque Nacional Nahuelbuta (Región del Biobío)

Experto y contacto
ONG Micófilos Chile, micofilos.chile@gmail.com

Bibliografía
ALTAMIRANO A & A LARA (2010) Deforestación en ecosistemas templados de la precordillera andina del centro-sur de Chile. Bosque 31 (1): 53-64.
DONOSO C (1981) Investigación y desarrollo forestal, Tipos forestales de los bosques nativos de Chile. Investigación y desarrollo forestal, Documento de trabajo N° 38. Santiago, Chile. 82 pp.
ECHEVERRÍA C, A NEWTON, L NAHUELHUAL, D COOMES & JM REY-BENAYAS (2012) How landscapes change: Integration of spatial patterns and human processes in temperate landscapes of southern Chile. Applied Geography, 32(2), 822-831.
FUENTES E, OTAIZA R, ALLIENDE M, HOFFMANN A, POIANI A (1984) Shrub clumps of the Chilean matorral vegetation: structure and possible maintenance mechanisms. Oecologia. 62. 405-411.
GARREAUD RD, JP BOISIER, R RONDANELLI, A MONTECINOS, HH SEPÚLVEDA & D VELOSO □ AGUILA (2020) The Central Chile Mega Drought

(2010–2018): A climate dynamics perspective. International Journal of Climatology, 40(1), 421-439.

GARRIDO N (1988) Agaricales s.l. und ihre Mykorrhizen in den Nothofagus-Wäldern Mittelchiles (Agaricales s.l. y sus micorrizas en los bosques de *Nothofagus* en Chile central). Bibliotheca Mycologica 120, J. Cramer, Berlin, Stuttgart, ISBN 3-443-59021-7

HORAK E (1964) Fungi Austroamerici. II. *Pluteus* Fr. Nova Hedwigia 8 (1-2): 163-199, 20 pls.

MIRANDA A, ALTAMIRANO, L CAYUELA, A LARA & M GONZÁLEZ (2017) Native forest loss in the Chilean biodiversity hotspot: revealing the evidence. Regional Environmental Change, 17(1), 285-297.

PISANO E (1954) Fitogeografía. La vegetación de las distintas zonas geográficas chilenas. Revista Geográfica de Chile Terra Australis 11: 95-107

ŠEVCÍKOVÁ H, FERISIN, E MALYSHEVA, A JUSTO, J HEILMANN-CLAUSEN, E HORAK, L KALININA, G KAYGUSUZ, H KNUDSEN, N MENOLLI, P MOREAU, G MUÑOZ, I SAAR, I TÜRKEKUL & F DOVANA (2022) *Pluteus insidiosus* Complex, Four New Species Described and *Pluteus reisneri* Resurrected. J. Fungi 2022, 8, 623. <https://doi.org/10.3390/jof8060623>.

Antecedentes adjuntos

Se adjuntan en formato digital:
Basidiomas de *P. flammipes*
Microscopía de *P. flammipes*
Mapa de distribución de *P. flammipes*

Sitios Web citados

Index Fungorum:
<http://www.indexfungorum.org/names/NamesRecord.asp?RecordID=337305>
Última consulta: 12/09/2021

MINTER DW, PEREDO H. (2006) Hongos de Chile. Disponible en:
<http://www.cybertruffle.org.uk/cgi-bin/robi.pl?glo=esp&location=CL&assoge=&assorg=&link=&organism=12165>
Última consulta: 12/09/2021

Autores de esta ficha

Christian Valdés-Reyes, Universidad de Talca y ONG Micófilos.

María José Dibán Karmy, Universidad de Chile, ONG Micófilos y Nemoris Australis

Sandra Troncoso Alarcón, Universidad de Concepción, ONG Micófilos y Lemu Rehue.

Viviana Salazar Vidal, Universidad Austral de Chile, ONG Micófilos y Lemu Rehue.

Ilustraciones incluidas



Figura 1: Fotografías de los basidiomas de *Pluteus flammipes* en A) y B) su sustrato, y C) y D) detalles en otros ángulos. (Fotografías de Bella Romero y María José Dibán).




Figura 2: Fotografías de microscopía óptica a 1000X en agua, A) esporas y b) pleurocistidio. (Fotografías de Bella Romero).


Observaciones propuestas por autor de esta ficha

Por su distribución en la zona centro de Chile, macroscópicamente es parecida a *Cyptotrama hygrocyboides*, sin embargo, esta seta tiene píleo rojizo con láminas color crema, mientras que en *P. flammipes* el píleo es marrón rojizo oscuro con láminas amarillentas a anaranjadas. No obstante, en ejemplares más adultos se podría llegar a confundir por el estado de los especímenes, se recomienda

microscopía.

Además, muy pocos *Pluteus* presentan basidiomas de colores escarlatas, anaranjados, o rojizos intensos. Una especie similar es *P. aurantiorugosus*, distinguida por su píleo de mayor tamaño y cutícula afieltrada, pero, no hay registro de este taxón en el país (Modificado según Horak 1964 y Rodríguez 2013).

Mapa de distribución de especie
Figura 3: Mapa de distribución de *Pluteus flammipes*
(Elaboración: Sebastián Vega Cabrera).



Los mapas aquí presentados se refieren o se relacionan con los límites fronterizos de Chile, no comprometen en modo alguno al Estado de Chile, de acuerdo al Artículos °2 letra g del DFL 83 de 1979, Ministerio de Relaciones Exteriores. La Información Cartográfica dispuestas es de carácter referencial.

